

Dystan®-Pulver

Zur bedarfsgerechten Zufütterung bei **Verdauungsstörungen** und Darmproblemen wie einer **veränderten Kotkonsistenz, Blähungen** und **allgemeiner Fressunlust**

✓ Enthält **Fichtennadeln, Wermut, Melisse, Kamille, Flohsamenschalen** und **Apfelpektin**

✓ Ergänzungsfuttermittel für **alle Tierarten**

Die natürlichen Inhaltsstoffe verfügen über **adstringierende, krampflösende** und **appetitanregende** Eigenschaften und fördern das Wohlbefinden und die Rekonvaleszenz.

✓ Packung à **20 x 100 g Beutel**



Fütterungsempfehlung

Kälber: 2–3x täglich 50 g in 1–2 Liter warmem Wasser auflösen und eingeben (bzw. 0,1–1,0 g/kg KGW)

Rinder, Pferde: 50–75 g je Gabe (bzw. 0,1 g/kg KGW)

Fohlen: bis 25 g je Gabe (bzw. 0,1–0,5 g/kg KGW)

Schweine (Absetzferkel, Läufer): bis 15 g je Gabe (bzw. 0,1–0,5 g/kg KGW)

Saugferkel: bis 6 g je Gabe (bzw. 0,1–1,0 g/kg KGW)

Hunde, Schafe: bis 25 g je Gabe (bzw. 0,1–1,0 g/kg KGW)

Geflügel: 0,1–1,0 g/kg KGW (nicht über Tränkesysteme verabreichen)

Kleine Haustiere: 0,1–1,0 g/kg KGW

Je nach Praktikabilität und Tierart kann das Pulver mit schmackhaftem Futter oder Futterbrei vermischt oder mit Wasser/Milch/Ersatzmilch verrührt verabreicht werden. Dieses Produkt ist nicht als Alleintränke/Alleinfuttermittel geeignet.

Dystan®-Poudre

Pour une alimentation complémentaire adaptée aux besoins en cas de **troubles digestifs** et de problèmes intestinaux tels qu'une **modification de la consistance des selles**, des **flatulences** et une **inappétence générale**.

- ✓ Contient **des aiguilles d'épicéa, de l'absinthe, de la mélisse, de la camomille, des téguments de psyllium et de la pectine de pomme**
- ✓ Aliment complémentaire pour **toutes les espèces animales**
- ✓ Les ingrédients naturels ont des propriétés **astringentes, antispasmodiques et stimulantes de l'appétit** et favorisent le bien-être et la convalescence.
- ✓ Carton de **20 sachets de 100 g**



Posologie/Mode d'emploi

Veaux : diluer 2 à 3 fois par jour 50 g dans 1 à 2 litres d'eau chaude et administrer (resp. 0,1 à 1,0 g/kg de poids corporel).

Bovins, chevaux : 50–75 g par administration (resp. 0,1 g/kg de poids corporel).

Poulains : jusqu'à 25 g par administration (resp. 0,1–0,5 g/kg de poids corporel).

Porcs (porcelets sevrés, jeunes porcs) : jusqu'à 15 g par administration (resp. 0,1–0,5 g/kg de poids corporel).

Porcelets allaitants : jusqu'à 6 g par administration (resp. 0,1–1,0 g/kg de poids corporel).

Chiens, moutons : jusqu'à 25 g par administration (resp. 0,1–1,0 g/kg de poids corporel).

Volailles : 0,1–1,0 g/kg de poids corporel (ne pas administrer via des systèmes d'abreuvement).

Petits animaux de compagnie : 0,1–1,0 g/kg de poids corporel.

En fonction de la praticabilité et de l'espèce, la poudre peut être mélangée à un aliment savoureux ou à une bouillie d'aliments, ou être administrée mélangée à de l'eau/du lait/du lait de substitution. Ce produit ne convient pas comme aliment/boisson complet(e).